

ESTUDIO BARBANZA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nº Total de pacientes incluidos: 6,325

Edad Media: 53.99 años

Varón (41.6%) / Mujer (58.4%)

Hipertensión Arterial: 1,967 pacientes / 31.1%

Enfermedades Cardiovasculares: 848 pacientes / 13.40%

Estudio CARDIOTENS 1999 : ECV 19%

ESTUDIO BARBANZA

Nº pacientes incluidos: 6,325

Hipertensos: 1,967 pac / 31.1%

Enfermedades cardiovasculares: 848 pacientes / 13.40%

Arritmias cardíacas: 254 pac / 6.24%

Cardiopatía Isquémica: 325 pac / 8%

Angina de Pecho: 142 pac / 3.5%


Infarto de Miocardio: 98 pac / 2.4%

Insuficiencia Cardíaca: 166 pac / 4.1%

Valvulopatías: 129 pac / 3.2%

ESTUDIO BARBANZA

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES



ESTUDIO BARBANZA

ENFERMEDAD CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON HTA

ARRITMIAS

HTA: 9%

INSUFICIENCIA CARDÍACA

HTA: 6%

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

HTA: 11%

ESTUDIO BARBANZA

IMPACTO DE LA HTA COMO DETERMINANTE DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES


HTA	ARRITMIAS	67.3%
HTA	INSUFICIENCIA CARDÍACA	70.7%
HTA	CARDIOPATÍA ISQUÉMICA	68.8%

**EL IMPACTO DE LA HTA EN LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES ES SUPERPONIBLE EN EL
ESTUDIO CARDIOTENS 1999**

ESTUDIO BARBANZA

INSUFICIENCIA CARDÍACA


(166 PACIENTES, 4.1%)



ESTUDIO BARBANZA

INSUFICIENCIA CARDÍACA


P
O
R
C
E
N
T
A
J
E



EDAD DEL PACIENTE

ESTUDIO BARBANZA

NIVELES DE PRESIÓN SISTÓLICA / DIASTÓLICA PARA ICC+HTA (70% total)




**OBJETIVO TENSIONAL
< 130/85 mmHg. OMS.**

ESTUDIO BARBANZA

INSUFICIENCIA CARDÍACA


TRATAMIENTOS



ESTUDIO BARBANZA

ARRITMIAS CARDÍACAS


254 pacientes, 6.24%



ESTUDIO BARBANZA

ARRITMIAS CARDÍACAS


PORCENTAJE



EDAD DEL PACIENTE

ESTUDIO BARBANZA

NIVELES DE PRESIÓN SISTÓLICA / DIASTÓLICA PARA ARRITMIAS+HTA (67% total)




**OBJETIVO TENSIONAL
< 130/85 mmHg. OMS.**

ESTUDIO BARBANZA

FIBRILACIÓN AURICULAR

TRATAMIENTOS



ESTUDIO BARBANZA

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

325 pacientes / 8%

MUJERES

42%

VARONES

58%

0%

20%


40%

60%

ESTUDIO BARBANZA

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA


PORCENTAJE



EDAD DEL PACIENTE

ESTUDIO BARBANZA


NIVELES DE PRESIÓN SISTÓLICA / DIASTÓLICA PARA CI+HTA (69% total)



**OBJETIVO TENSIONAL
< 130/85 mmHg. OMS.**

ESTUDIO BARBANZA

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA



ESTUDIO BARBANZA

PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Nº Y % DE PACIENTES CON CT > 200 170 / 63.91%

Nº Y % DE PACIENTES CON CT > 250 49 / 18.42%

Nº Y % DE PACIENTES CON LDL > 100 176 / 89.80

Nº Y % DE PACIENTES CON LDL > 130 119 / 60.71%

Nº Y % DE PACIENTES CON HDL < 35 22 / 11.28%

Nº Y % DE PACIENTES CON TG > 200 29 / 11.11%

ESTUDIO BARBANZA

DOCTORES PARTICIPANTES

LADO LLERENA

AUGUSTO NORES

GUTIERREZ FDEZ

LLAMAS

TOUCEDO

LOUREIRO

LAGE

VAAMONDE MOSQUERA

TORRES COLOMER

PAULA DE BLAS

FEIJO

ESPERANZA RODRIGUEZ

TURRADO

SANTOS

MAESTRO

MUÑIZ

LADO LOPEZ

XUÑO

DOMINGUEZ

ADORACION XUIZ

PASTOR BENAVENT, JM FERNANDEZ VILLAVERDE